



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๐๖-๗ โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๕๕๕
อินเทอร์เน็ต www.prd.go.th

ข่าวที่ ๖๕๕ / ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก รุนแรงที่สุดในรอบ ๓๐ ปี

ปี ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยโรคมือ เท้าปาก มากที่สุดในรอบ ๓๐ ปี ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าถึงจุดสูงสุดของการแพร่เชื้อแล้วหรือไม่ เพราะในเดือน ก.ค. ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยโรคนี้ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก แต่ในปีนี้พบการกระจายเชื้อในเด็กโตอายุไม่เกิน ๑๒ ปีด้วย

นพ.วงวัฒน์ ลีวลักษณ์ ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ ๑๖ ก.ค. พบผู้ป่วย ๒,๓๒๒ คน สูงกว่าปีก่อน แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยพบมากในเด็กแรกเกิด - ๔ ขวบ ถึงร้อยละ ๘๗ ในช่วง ๕ - ๙ ขวบ ร้อยละ ๑๐.๙ อายุ ๑๐-๑๔ ปี ร้อยละ ๑ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก ไม่ใช่โรคใหม่ โดยในประเทศไทยมีการพบมานาน ๔๐-๕๐ ปีก่อน มีผู้ป่วยทุกปีอัตราป่วย ๑๐ ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วยพบบ่อยในช่วงเปิดเทอมและฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้เชื้อติดกันง่าย และในปี ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก มากที่สุดในรอบ ๓๐ ปี ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าถึงจุดสูงสุดของการแพร่เชื้อแล้วหรือไม่ เพราะในเดือน ก.ค.ก็ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยโรคนี้ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก แต่ในปีนี้พบการกระจายเชื้อในเด็กโตอายุไม่เกิน ๑๒ ปีด้วย ลักษณะอาการของผู้ป่วยจะมีไข้ น้ำลายยืด ไม่กลืนน้ำลายเพราะมีแผลในคอและเพดานปากคล้ายแผลร้อนใน ฝ่ามือ ฝ่าเท้า มีตุ่มน้ำใส บางรายอาจมีตุ่มใสขึ้นตามข้อเข่า ข้อศอก และง่ามก้น ส่วนบริเวณตัวจะมีน้อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มอายุ ๑-๒ ขวบ อายุ ๕ ขวบขึ้นไปจะพบน้อย ปัจจุบันไม่มียาต้านไวรัส การรักษาจะดำเนินการรักษาตามอาการ และไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อ แต่มีการวิจัยอยู่ในขั้นตอนทดลองที่ประเทศไต้หวัน

ส่วนการป้องกันจะต้องเน้นในเรื่องสุขอนามัยทั้งของเด็กและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่และสิ่งของที่เด็กจะต้องใช้ร่วมกัน เช่น ของเล่นในห้างสรรพสินค้า ในระยะนี้อาจจำเป็นต้องรณรงค์ให้มีการดูแลความสะอาดมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยแพร่เชื้อ และจะช่วยลดอัตราผู้ป่วยของโรคลงได้
