



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๐๖-๗ โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๔๔๕
อินเทอร์เน็ต www.prd.go.th

ข่าวที่ ๒๔๖ / ๒๕๕๕
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

อันตรายสารฟิลเลอร์-เตือนฉีดอัมพัต้งทำตาบอดได้

**การฉีดฟิลเลอร์ด้วยสารโพลีอะคริลามายด์ (Polyacrylamide) ซึ่งมักโฆษณาว่า
อยู่ได้ ๒-๓ ปี สลายตัวช้า แต่ความจริงสารดังกล่าวไม่สลายตัวเลย**

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผศ.นพ.ณอม บรรณประเสริฐ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการแถลงข่าว
อันตรายจากการฉีดกล่าวว่า เทคนิคฟิลเลอร์เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะเป็นวิธีที่ง่าย คือใช้การฉีด เหมือนการฉีดยา
เท่านั้น แต่พบว่าวิธีฟิลเลอร์เพื่อสร้างเป็นต้งจมูก มีภาวะแทรกซ้อน คือทำให้เกิดตาบอด ซึ่งพบผู้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวแล้ว ๕-๑๐ ราย เพราะบริเวณจมูกมีเส้นเลือดแขนงจำนวนมาก ที่เชื่อมต่อกับระบบหลอดเลือด
ของประสาทตา และสมองโดยตรง โดยปกติการฉีดสารจะต้องฉีดเข้าไปใต้ระหว่างผิวหนัง หากพลาดและสาร
เข้าไปที่หลอดเลือดที่ไปตีดวงตา แม้เพียงไม่ถึงซีซี ก็จะทำให้ตาบอดภายในไม่กี่นาที ถือเป็นความสูญเสียถาวร
นอกจากนี้ ยังพบว่าหากสารเข้าไปที่หลอดเลือดที่ไปยังสมองอาจก่อให้เกิดอาการอัมพาตได้ด้วย แต่พบได้น้อยกว่า
ภาวะตาบอด “ปัจจุบันยังพบการฉีดฟิลเลอร์ ด้วยสารโพลีอะคริลามายด์ (Polyacrylamide) ซึ่งมักโฆษณาว่าอยู่
ได้ ๒-๓ ปี สลายตัวช้า แต่ความจริงสารดังกล่าวไม่สลายตัว และอย.สหรัฐอเมริกาถอนการรับรอง เพราะพบว่าทำ
ให้เกิดมะเร็งได้ ด้วย โดยพบว่าประชาชนนิยมไปฉีดหน้าอก สะโพก ในปริมาณสูงมากเป็นพันซีซี จึงขอเตือนว่า
หากเกิดสารรั่วไหลเข้าเส้นเลือดจะเกิดอันตรายอย่างยิ่ง โดยหากหลุดเข้าไปที่ปอดจะทำให้ปอดอุดกั้นและขาด
อากาศหายใจทันที หรือหากอุดบริเวณเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงขา ก็จะทำให้ขาเน่าได้ ซึ่งกรณีพรีตตี้ คาคว่าสารน่าจะ
เข้าไปในหลอดเลือดดำ และย้อนกลับไปยังปอด ทำให้คนไข้ขาดออกซิเจน และหยุดหายใจ” ผศ.นพ.ณอมกล่าว

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า เทคนิคฟิลเลอร์คือ การฉีด
สารเข้าไปเติมเต็มระหว่างชั้นผิวหนัง ที่พร่องไปตามวัย โดยนิยมฉีดเพื่อเติมร่องแก้ม หน้าผาก รอยสิว และการเพิ่ม
เนื้อเยื่อจุดต่างๆ เช่น จมูก คาง ริมฝีปาก แทนการผ่าตัด และเดิมมีการใช้คอลลาเจน แต่พบว่าแพ้ง่าย จึงมีการใช้
สารกลุ่มไฮยาลูโรนิกแอซิด ซึ่งมีความปลอดภัยสูง โดยสารกลุ่มนี้จะมีอายุการใช้งาน ๔-๖ เดือน หลังจากนั้นก็จะ
สลายตัวไปตามธรรมชาติ ทำให้มีความปลอดภัยสูง ส่วนสารที่อยู่แบบถาวร (Permanent Filler) พบว่า มีการใช้
ซิลิโคน หรือพาราฟิน ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต เมื่อฉีดเข้าไปแล้วสารจะอยู่ในผิวหนังตลอดและมีผลข้างเคียง
