



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๐๖-๗ โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๕๕๕
อินเทอร์เน็ต www.prd.go.th

ข่าวที่ ๓๖๐ / ๒๕๕๕

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วคุม 'คอตีบ' ๘ จังหวัด

สาธารณสุข ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ๑๗ ทีม ใน ๘ จังหวัด โดยมี ๓ มาตรการ
ในการดำเนินงาน โรคนี้พบมานานแล้ว แต่เป็นโรคที่ควบคุมได้

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคคอตีบตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน-วันที่ ๒๕ กันยายนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคคอตีบ ๕๔ ราย เป็นผู้ป่วยจาก จ.เลย ๔๖ ราย จ.เพชรบูรณ์ ๑๐ ราย และ จ.หนองบัวลำภู ๓ ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย โดยอยู่ใน จ.เลย ทั้ง ๒ ราย และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อาจไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงส่งทีม ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑๗ ทีม ลงพื้นที่อย่างเข้มข้นใน ๘ จังหวัด ที่เกิดโรคและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย พิจิตร โขงแก่น และชัยภูมิ โดยเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการในการควบคุมโรคคอตีบ ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑.ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว ๒.สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เข้มแข็ง ๓.เน้นสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในทุกภาคส่วน

นพ.พรเทพกล่าวอีกว่า โรคคอตีบเป็นโรคที่พบมานานแล้ว แต่สามารถควบคุมได้เนื่องจากมีวัคซีนป้องกันบรรจุอยู่ในชุดวัคซีนพื้นฐานฉีดให้เด็กไทยทุกคนฟรี ตั้งแต่อายุ ๒ เดือน ๔ เดือน และ ๖ เดือน และกระตุ้นอีก ๓ ครั้ง เมื่ออายุ ๑ ขวบครึ่ง ๔ ขวบ และ ๑๒ ปี หรือกำลังเรียนชั้น ป.๖ ลักษณะของเชื้อโรคจะอยู่ในลำคอของผู้ป่วย และติดต่อทางการไอ จาม อาการจะปรากฏหลังได้รับเชื้อประมาณ ๒-๕ วัน คือ มีไข้ต่ำๆ คล้ายไข้หวัด ไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร กลืนลำบาก ลักษณะพิเศษคือจะมีแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นที่ทอนซิลทั้ง ๒ ข้างและลิ้นไก่ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะทำให้ทางเดินหายใจตีบตัน หายใจลำบาก กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และปลายประสาทอักเสบทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตอาจเสียชีวิตได้ จึงแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด และต้องฉีดให้ครบตามจำนวน
