

แบบรายงานการติดตามข่าวและรายการ
กองอำนวยการการประสานข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (กปฉ.)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2552

ประเด็นจากสื่อ	การวิเคราะห์	ข้อเสนอแนะ
Bloomberg -Malaria Strain resists Drugs, may Threaten Millions, Study Says The Independent -Scientists Alarmed by Drug-resistant Malaria Science Daily -Threat of Resistance to Artemisinin-based Anti-malarial Drugs Highlighted by New Study US News and World Report -Resistance to Malaria Drug Reported in Cambodia Millions at Risk if Artemisinin Treatment Becomes Ineffective, Study Says The New England Journal of Medicin -Artemisinin-Resistant Malaria in Asia รายงานการศึกษาของหน่วยวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อนมหิดล-อ็อกฟอร์ด ระบุว่า เชื้อมาลาเรียกำลังดื้อยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษา คือยาในตระกูลอาร์ติเมซินิน โดยพบว่า การรักษาด้วยยาในตระกูลนี้กับผู้ป่วยในภาคตะวันตกของกัมพูชาต้องใช้เวลานานกว่าเดิมเกือบ 2 เท่า คือ 84 ชั่วโมงกว่าจะขจัดเชื้อมาลาเรียออกจากกระแสเลือดได้ เทียบกับการรักษาผู้ป่วยทางตะวันตกเฉียงเหนือของไทยที่ใช้เวลาเพียง 48 ชั่วโมง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเกิดกรณีเชื้อมาลาเรียดื้อยามาแล้วถึง 2 ครั้ง จนท้ายสุดเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของโลก โดยเฉพาะทวีปแอฟริกา ส่งผลให้คนแอฟริกันเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นักวิทยาศาสตร์จึงเตือนว่า ต้องเร่งหาทางยับยั้งเชื้อมาลาเรียดื้อยารั้งนี้ ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้างเหมือนในอดีต มิฉะนั้นจะมีผู้คนหลายล้านคนล้มตายทั่วโลก	สื่อต่างประเทศสนใจรายงานประเด็นการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียเนื่องจากเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ในภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับโรคอุบัติใหม่เช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009	ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล-อ็อกฟอร์ด เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคนี้โดยประชาสัมพันธุ์วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

Xinhua -Thailand's Death Toll from A/H1N1 Flu Contraction Rises to 65 -Thailand, Australia, Malaysia Report More Flu-related Deaths กระทรวงสาธารณสุขของหลายประเทศรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไทยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 21 คน รวมเป็น 65 คน ส่วนออสเตรเลีย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 คน รวมเป็น 21 คน ในขณะที่มาเลเซียมีผู้เสียชีวิตรวม 4 คน สำหรับเวียดนาม ยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 31 คน รวมเป็น 703 คน ลาว มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 คน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 23 คน รวมทั้งหมด 113 คน สำหรับอินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 28 คน รวมทั้งหมด 444 คน	การเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่างประเทศเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศในภูมิภาค แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส H1N1 ยังไม่สามารถควบคุมได้และยังมีความจำเป็นที่รัฐบาลของทุกประเทศต้องเร่งจัดหาวัคซีนไวรัสและวัคซีนให้แก่ประชาชนต่อไป	เร่งประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองและการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้มากขึ้น โดยเฉพาะการณรงค์ให้ใช้น้ำกากอนามัยในที่สาธารณะ การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ รวมทั้งการรีบไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้หวัด
--	--	---